

Prospect: Informații pentru utilizator**Viranti 50 mg/g creion cutanat**
Aciclovir

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Viranti și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Viranti
3. Cum să utilizați Viranti
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Viranti
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Viranti și pentru ce se utilizează

Viranti este utilizat pentru tratamentul leziunilor herpetice. Substanța activă este aciclovir, un agent antiviral. Aplicați de la primele semne de leziune herpetică (cum ar fi furnicături și mâncărime). Poate fi utilizat și pentru a accelera vindecarea, dacă leziunea herpetică a apărut deja.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Viranti**Nu utilizați Viranti:**

- dacă sunteți alergic la aciclovir, valaciclovir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- în interiorul gurii;
- pentru tratarea leziunilor de la nivelul gurii (afte);
- la nivelul ochilor sau zonei genitale.

Atenționări și precauții

Evitați atingerea unei leziuni herpetice pentru a preveni răspândirea infecției sau agravarea acesteia. Dacă vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveți un sistem imunitar slăbit, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a trata orice tip de infecție.

Dacă nu sunteți sigur că aveți o leziune herpetică, adresați-vă medicului dumneavoastră.

În cazul în care leziunile herpetice devin foarte severe, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Viranti conține ulei de ricin care poate provoca reacții adverse la nivelul pielii.

Viranti conține butilhidroxitoluen, care poate provoca reacții adverse la nivelul pielii, localizate (de exemplu, dermatită de contact) sau iritație a ochilor sau mucoaselor.

3. Cum să utilizați Viranti

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Recomandări pentru toate vârstele:

- Aplicați la primele semne de leziune herpetică (cum ar fi furnicături și mâncărime).
- Aplicați pe toată zona afectată de 5 ori pe zi.
- Continuați tratamentul timp de 4 zile. Dacă leziunea herpetică nu s-a vindecat după acest timp, puteți utiliza creionul cutanat pentru o perioadă de până la 10 zile în total.
- Tratați-vă leziunile herpetice timp de 4 zile întregi pentru a vă asigura vindecarea rapidă.
- Dacă uitați să aplicați o dată, aplicați atunci când vă amintiți și continuați ca înainte.
- Dacă leziunea herpetică nu s-a vindecat complet după 10 zile sau dacă se agravează în orice moment, contactați medicul.
- Nu dați niciodată medicamentul dumneavoastră Viranti altor persoane, chiar dacă simptomele lor sunt identice cu ale dumneavoastră.
- Conținutul din interiorul acestui creion cutanat este suficient pentru tratamentul unui episod herpetic. Pentru eventualele recidive, începeți tratamentul la primele semne ale unei leziuni herpetice (cum ar fi furnicături sau mâncărime). Tratamentul poate fi inițiat și în cazul în care au apărut deja vezicule.
- Nu utilizați mai mult decât doza recomandată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Întrerupeți utilizarea acestui medicament și spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți:

- reacții asemănătoare alergiei, de exemplu, umflare a buzelor, feței și pleoapelor.

Este posibil să apară următoarele reacții adverse:

- senzație de arsuri ușoare sau înțepături după aplicare. Acestea vor dispărea repede.
- roșeață, mâncărime sau uscăciune ușoară/descumare a pielii, erupții trecătoare pe piele, urticarie sau iritații.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agentția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale,

str. Aviator Sănătescu nr. 48,

sector 1, București 011478- RO,

tel: + 4 0757 117 259, fax: +4 0213 163 497,

e-mail: adr@anm.ro .

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Viranti

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe creionul cutanat după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Viranti

- Substanța activă este aciclovir.
- Celelalte componente sunt: ulei de ricin, gliceride semisintetice, ceară de carnauba, ceară de albine, octildodecanol, parafină albă, aromă de vanilie, butilhidroxitoluen (E321).

Cum arată Viranti și conținutul ambalajului

Viranti 50 mg/g creion cutanat este disponibil sub formă de masă cilindrică, albă până la galben deschis, ușor parfumată.

Aceasta este conținută într-un tub din polistiren, cu o glisieră din rășină acetalică, închis cu un capac.

Mărimi de ambalaj: 1 creion cutanat în cutie de carton.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Labormed-Pharma S.A.

Bd. Theodor Pallady, Nr. 44B, Sector 3, București, România

Fabricant

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. SELLA SRL

Via Vicenza 67, 36015, Schio (Vicenza),

Italia

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Bulgaria	Виранти 5% пръчица за кожа
Croația	Viranti 5% štapić za kožu
Islanda	Viranti 5 % húðstifti
Portugalia	Viranti 50 mg/g Lapis cutâneo
România	Viranti 50 mg/g creion cutanat
Ungaria	Viranti 50 mg/g külsőleges gyógyszeres rúd

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2021.