

Prospect: Informații pentru pacient**IBUVALEN 400 mg capsule**
Ibuprofen

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă după 3 zile în cazul adolescenților sau după 7 zile în cazul adulților nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Ibuvalen 400 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ibuvalen 400 mg
3. Cum să utilizați Ibuvalen 400 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Ibuvalen 400 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Ibuvalen 400 mg și pentru ce se utilizează

Ibuvalen 400 mg face parte din grupa medicamentelor denumite AINS (medicamente antiinflamatoare nesteroidiene) care acționează reducând durerea, inflamația și febra.

Ibuvalen 400 mg este utilizat pentru a calma durerile ușoare până la moderate, cum sunt durerea de cap, incluzând migrena, durerea de dinți, durerea menstruală și pentru a reduce febra.

Medicamentul poate fi utilizat de către adulții și adolescenții (cu vârsta de 12 ani și peste), cu greutatea de cel puțin 40 kg.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ibuvalen 400 mg

Nu utilizați Ibuvalen 400 mg

- **dacă sunteți alergic** la ibuprofen sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).
- **dacă ați avut reacții alergice**, cum sunt astm bronșic, secreții nazale, erupție trecătoare pe piele cu mâncărime sau umflarea buzelor, a feței, a limbii sau a gâtului **după ce ați luat medicamente care conțin acid acetilsalicilic sau alte medicamente pentru durere și inflamație** (AINS).
- **dacă ați avut ulcer sau sângerare** la nivelul stomacului sau intestinului subțire (duoden) legate de utilizarea anterioară a medicamentelor pentru durere și inflamație (AINS)
- **dacă aveți ulcer sau sângerare** la nivelul stomacului sau intestinului subțire (duoden) sau **dacă ați avut două sau mai multe astfel de episoade** în trecut
- **dacă aveți probleme severe** ale ficatului, rinichilor sau inimii (incluzând boala **cardiacă coronariană**)
- dacă sunteți în **ultimele 3 luni de sarcină**
- dacă sunteți **sever deshidratat** (stare determinată de vărsături, diaree sau consumul insuficient de lichide)
- **dacă aveți orice sângerare activă** (inclusiv la nivelul creierului)
- **dacă aveți** o afecțiune de origine necunoscută având ca rezultat **formarea neobișnuită a celulelor sanguine**

Ibuvalen 400 mg nu se administrează la copii cu vârsta sub 12 ani și nici la adolescenți sau adulți cu greutatea sub 40 kg.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Ibuvalen 400 mg, adresați-vă medicului dumneavoastră:

- **dacă aveți** lupus eritematos sistemic (LES) sau alte **afecțiuni autoimune**
- **dacă există** în familie o **tulburare în producerea pigmentului roșu din sânge** (porfirie)
- dacă aveți afecțiuni intestinale inflamatorii cronice, cum sunt **inflamația colonului cu ulcere** (colită ulcerativă), o **inflamație care afectează tractul digestiv** (boală **Crohn**) sau alte afecțiuni ale stomacului sau intestinului
- **dacă aveți tulburări de formare a celulelor sanguine**
- **dacă aveți** probleme legate de mecanismul de coagulare normală al sângelui
- **dacă aveți alergii, febra fânului, astm bronșic, inflamație cronică a mucoasei nazale și a sinusurilor, vegetații adenoide sau afecțiuni obstructive cronice** ale tractului respirator, deoarece riscul de îngustare a căilor respiratorii cu dificultăți în respirație (bronhospasm) este mai mare
- **dacă aveți probleme de circulație** la nivelul arterelor mâinilor sau picioarelor
- **dacă aveți probleme** de ficat, rinichi, inimă sau tensiune arterială mare
- **dacă ați avut recent o intervenție chirurgicală majoră**
- dacă sunteți în **primele șase luni de sarcină**
- **dacă alăptați.**

La utilizarea îndelungată a Ibuvalen 400 mg, este necesară evaluarea regulată a valorilor testelor funcției ficatului, a funcției rinichilor, cât și hemograma.

Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici doze eficiente pentru cea mai scurtă perioadă.

Vârstmici

Dacă sunteți în vârstă veți fi mai expus la reacții adverse, în special sângerare și perforație la nivelul tractului digestiv, care pot fi letale.

Ulcere, perforație și sângerare la nivelul stomacului sau intestinelor

Dacă ați avut anterior ulcer la nivelul stomacului sau intestinelor, în special dacă acesta a fost complicat cu perforație sau a fost însoțit de sângerare, trebuie să fiți atent la orice simptome abdominale neobișnuite și să spuneți imediat medicului dumneavoastră, mai ales dacă aceste simptome apar la începutul tratamentului. Aceasta este necesar, deoarece riscul de sângerare sau de ulcerare la nivelul tractului digestiv este mai mare în acest caz, în special la pacienții vârstnici.

Dacă apare sângerarea sau ulcerarea la nivelul tractului digestiv, tratamentul trebuie întrerupt.

Sângerarea, ulcerarea sau perforația la nivelul stomacului sau intestinelor pot apărea fără alte semne de avertizare, chiar și la pacienții care nu au avut niciodată astfel probleme.

Acestea pot fi, de asemenea, letale.

Riscul de apariție a ulcerelor, perforației sau sângerării la nivelul stomacului sau intestinelor crește la doze mari de ibuprofen. Riscul crește, de asemenea, dacă anumite alte medicamente sunt luate în același timp cu ibuprofenul (vezi mai jos, Ibuvalen 400 mg împreună cu alte medicamente).

Reacții la nivelul pielii

Trebuie să încetați în a mai lua Ibuvalen 400 mg la primul semn de erupție trecătoare pe piele, leziuni la nivelul mucoaselor sau alte semne de alergii, deoarece acestea pot fi primul semn al unor reacții ale pielii grave (dermatită exfoliativă, eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell), uneori cu rezultat letal. Cel mai mare risc al apariției acestor reacții este în prima lună de tratament.

Efecte asupra inimii și creierului

Medicamente precum Ibuvalen 400 mg se pot asocia cu un risc ușor crescut de apariție a atacului de cord (infarct miocardic) sau a accidentului vascular cerebral. Riscurile de orice tip sunt mai probabile la doze mari și în cazul tratamentului de lungă durată.

Nu depășiți doza recomandată sau durata tratamentului (7 zile la adulți sau 3 zile la copii și adolescenți).

Dacă aveți probleme cu inima, accident vascular cerebral în antecedente sau considerați că ați putea fi în situație de risc datorită acestor afecțiuni (de exemplu, dacă aveți tensiune arterială mare, diabet zaharat sau valori mari ale colesterolului sau sunteți fumător) trebuie să discutați despre tratament cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Efecte asupra rinichilor

Ibuprofenul poate determina probleme în funcționarea rinichilor, chiar și la pacienții care nu au mai avut astfel de probleme. Aceste probleme pot determina umflarea picioarelor și pot conduce chiar la insuficiență cardiacă sau tensiune arterială mare la persoanele predispuse.

Ibuprofenul poate determina leziuni la nivelul rinichilor, în special la pacienții care deja au avut probleme la nivelul rinichilor, inimii sau ficatului sau care iau diuretice sau inhibitori ai ECA, precum și la vârstnici. Cu toate acestea, întreruperea tratamentului cu ibuprofen, în general, conduce la vindecare.

Alte precauții

În tratamentul de lungă durată, la utilizarea de doze mari de analgezice, poate să apară durerea de cap care nu trebuie tratată prin creșterea dozelor din acest medicament. Utilizarea de rutină a analgezicelor poate determina leziuni renale permanente și risc de insuficiență renală.

Ibuprofen poate masca simptomele sau semnele unei infecții (febră, durere și inflamație) și poate prelungi temporar timpul de sângerare.

Ibuvalen 400 mg poate reduce posibilitatea de a rămâne gravidă. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră dacă planificați să rămâneți gravidă sau dacă aveți probleme în a rămâne gravidă.

Copii și adolescenți

Nu se administrează copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Ibuprofen poate determina probleme ale rinichilor la copiii și adolescenții deshidratați.

Ibuvalen 400 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Reacțiile adverse ale Ibuvalen 400 mg **pot crește** dacă anumite medicamente sunt luate în același timp. Pe de altă parte, Ibuvalen 400 mg **poate crește sau scădea efectul altor medicamente** sau crește apariția reacțiilor adverse ale acestora când sunt luate în același timp.

Vă rugăm să îi spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați:

- alte AINS
- acid acetilsalicilic
- anticoagulante (împotriva coagulării sângelui), cum este warfarina sau heparina
- antiagregante plachetare (împotriva coagulării sângelui), cum este ticlopidina sau clopidogrelul
- metotrexat (utilizat în tratamentul cancerului și afecțiunilor autoimune)
- digoxină (pentru tratamentul diferitelor afecțiuni ale inimii)
- fenitoină (utilizată pentru a preveni apariția convulsiilor epileptice)
- litiu (utilizat în tratamentul depresiei și maniei)
- diuretice (comprimate pentru eliminarea apei), incluzând diuretice care economisesc potasiu
- antihipertensive (pentru tratamentul tensiunii arteriale mari), cum sunt:
 - inhibitori ai ECA, de exemplu, captopril
 - medicamente beta blocante
 - antagoniști de angiotensină II
- colestiramină (utilizată în tratamentul valorilor mari ale colesterolului)
- aminoglicozide (medicamente împotriva anumitor tipuri de bacterii)
- ISRS (medicamente împotriva depresiei), cum sunt paroxetina, sertralina, citalopramul
- moclobemidă (IMAO selectiv și reversibil – un medicament utilizat în tratamentul bolilor depresive sau fobiilor sociale)
- ciclosporină, tacrolimus (pentru inhibarea sistemului imunitar după transplantul de organe)
- zidovudină sau ritanovir (utilizat în tratamentul infecțiilor cu HIV)
- mifepristonă
- probenecid sau sulfinpirazonă (pentru tratamentul gutei)
- antibiotice chinolone
- sulfoniluree (pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2)
- corticosteroizi (utilizați împotriva inflamațiilor)
- bisfosonați (utilizați în osteoporoză, boala Paget și pentru a reduce valorile mari ale calciului din sânge)
- oxpentifilină (pentoxifilină) (utilizată în tratamentul afecțiunii circulatorii ale arterelor picioarelor sau brațelor)
- baclofen (un relaxant pentru mușchi).

Ibuvalen 400 mg împreună cu alimente, băuturi și alcool

Capsulele trebuie înghițite întregi și cu o cantitate suficientă de lichid (un pahar cu apă), în timpul mesei sau după masă.

Capsulele pot fi luate cu sau fără alimente.

Evitați alcoolul etilic, deoarece acesta accentuează reacțiile adverse la Ibuvalen 400 mg, în special pe acelea care afectează stomacul, intestinele sau creierul.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Sarcina

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Ibuprofenul nu trebuie luat în ultimele 3 luni de sarcină, deoarece poate determina la făt tulburări majore la nivelul inimii, plămânilor și rinichilor. Dacă este utilizat la sfârșitul sarcinii, poate determina tendință de sângerare atât la mamă, cât și la copil și diminuează puterea contracțiilor uterine întârziind debutul nașterii. Tratamentul în timpul primelor 6 luni de sarcină va fi recomandat numai de către medicul dumneavoastră, dacă este absolut necesar.

Alăptarea

Ibuprofenul trece în cantități foarte mici în laptele matern și, de obicei, alăptarea nu trebuie întreruptă în timpul tratamentelor de scurtă durată. Cu toate acestea, dacă vi se recomandă un tratament de lungă durată, trebuie luată în considerare întreruperea definitivă a alăptării la sân.

Fertilitatea

Medicamentul aparține unui grup de medicamente (AINS) care pot scădea fertilitatea la femei. Acest efect este reversibil la întreruperea administrării medicamentului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În general, ibuprofenul nu are reacții adverse asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, întrucât la doze mari, în cazuri individuale, se pot manifesta reacții adverse, cum sunt oboseală, somnolență, senzație de învârtire (raportate ca frecvente) și tulburări de vedere (raportate ca mai puțin frecvente), capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje ar putea fi afectată. Acest efect este accentuat în cazul consumului concomitent de alcool etilic.

3. Cum să utilizați Ibuvalen 400 mg

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai scurte perioade necesare controlării simptomelor.

Adulții nu trebuie să ia Ibuvalen 400 mg pentru mai mult de 7 zile consecutiv fără recomandarea medicului. Adolescenții nu trebuie să ia Ibuvalen 400 mg pentru mai mult de 3 zile fără recomandarea medicului.

Doza de ibuprofen depinde de vârsta și greutatea corporală a pacientului. Doza recomandată este:

Durere ușoară până la moderată și febră (inclusiv migrenă)

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani (≥ 40 kg):

1 capsulă inițial, apoi dacă este necesar, luați 1 capsulă la intervale de 6 ore.

Doza maximă zilnică nu trebuie să depășească **3 capsule (1200 mg)**.

Copii cu vârsta mai mică de 12 ani (< 40 kg):

Ibuprofen 400 mg nu trebuie utilizat la copiii cu greutatea sub 40 kg și cu vârsta sub 12 ani, din cauza cantității de substanță activă dintr-o capsulă.

Durere menstruală

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani (≥ 40 kg):

1 capsulă de 1-3 ori pe zi, la intervale de 6 ore, la nevoie.

Doza maximă zilnică nu trebuie să depășească **3 capsule (1200 mg)**.

Capsula trebuie înghițită cu un pahar cu apă, în timpul mesei sau după masă.

Dacă sunteți adult și starea dumneavoastră nu se îmbunătățește în decursul a 7 zile sau dacă se agravează, trebuie să vă prezentați la medic. Dacă un adolescent are nevoie de acest medicament mai mult de 3 zile, sau dacă simptomele se agravează, acesta trebuie consultat de un medic.

Vârșnici

Dacă sunteți în vârstă, cereți întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua Ibuprofen 400 mg, deoarece sunteți mai predispuși la reacții adverse, în special la hemoragie și perforație la nivelul tractului digestiv, care pot fi letale. Medicul dumneavoastră vă va sfătui în consecință.

Funcția rinichilor sau a ficatului redusă

Dacă aveți funcția rinichilor sau a ficatului redusă, cereți întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua Ibuprofen 400 mg. Medicul dumneavoastră vă va sfătui în consecință.

Dacă utilizați mai mult Ibuprofen 400 mg decât trebuie

Dacă ați luat mai mult Ibuprofen 400 mg decât trebuie, adresați-vă imediat unui medic, la cea mai apropiată unitate de primiri urgente a unui spital sau la farmacie.

Simptomele unui supradozaj pot fi: greață, vărsături și durere de stomac sau diaree. De asemenea, pot apărea țuuituri în urechi, durere de cap, amețeli, senzație de învârtire și sângerare la nivelul stomacului sau intestinelor. În cazuri de intoxicație gravă, poate apărea somnolență, excitație, dezorientare, comă, convulsii, crampe (în special la copii), vedere încețoșată și probleme de vedere, insuficiență renală, leziuni la nivelul ficatului, tensiune arterială mică, respirație îngreunată, colorarea în albastru a buzelor, a limbii și a degetelor și creșterea tendinței de sângerare. De asemenea, poate apărea agravarea astmului bronșic la pacienții cu astm bronșic.

Dacă uitați să utilizați Ibuprofen 400 mg

Dacă ați uitat să luați o doză, luați-o cât mai repede posibil, cu excepția cazului în care au rămas mai puțin de patru ore până la următoarea doză.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele.

Posibilitatea de apariție a reacțiilor adverse crește la doze mai mari și la o durată mai lungă de tratament. Medicamente precum ibuprofenul se pot asocia cu un risc ușor crescut de apariție a atacului de cord (infarct miocardic) sau a accidentului vascular cerebral.

Retenție de apă (edem), tensiune arterială mare și insuficiență cardiacă au fost raportate în asociere cu AINS.

Evaluarea reacțiilor adverse a fost făcută în funcție de frecvența de apariție a acestora.

S-a utilizat următoarea convenție:

Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 pacient din 10

Frecvente: afectează 1 până la 10 pacienți din 100

Mai puțin frecvente: afectează 1 până la 10 pacienți din 1000

Rare: afectează 1 până la 10 pacienți din 10000

Foarte rare: afectează mai puțin de 1 pacient din 10000

Cu frecvență necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile

Următoarele reacții adverse sunt importante și necesită intervenție imediată, dacă apar.

Trebuie să încetați de a mai lua Ibuvalen 400 mg și să vă adresați imediat medicului dumneavoastră dacă apar următoarele simptome:

Frecvente:

- scaune de culoarea păcurii sau vărsături cu sânge (ulcer la nivelul tractului digestiv cu sângerare)

Foarte rare:

- umflare a feței, a limbii sau a gâtului (laringe) care poate determina dificultăți în respirație (edem angioneurotic), bătăi rapide ale inimii, scădere severă a tensiunii arteriale sau șoc cu potențial letal
- reacție alergică bruscă cu scurtarea respirației, respirație șuierătoare și scăderea tensiunii arteriale
- erupție severă pe piele cu vezicule, în special pe picioare, brațe, palme și tălpi care pot implica și fața și buzele (eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson). Acestea se pot agrava și mai mult, veziculele se pot lărgi și extinde și părți ale pielii se pot coji (sindromul Lyell). De asemenea, poate exista o infecție severă cu distrugerea pielii (necroză), a țesutului subcutanat și mușchilor.

Trebuie să încetați a mai lua medicamentul și să vă adresați medicului dumneavoastră cât mai repede posibil, dacă manifestați următoarele reacții adverse:

Foarte frecvente:

- senzație de arsură în capul pieptului, durere abdominală, indigestie

Mai puțin frecvente:

- vedere încețoșată sau alte probleme de vedere; sensibilitatea la lumină în special a pielii;
- reacții de hipersensibilitate, cum sunt erupția trecătoare pe piele, mâncărimea, criza de astm bronșic (uneori cu tensiune arterială mică)

Rare:

- pierdere a vederii.

Foarte rare:

- umplere bruscă a plămânilor cu apă având ca rezultat dificultăți în respirație, tensiune arterială mare, retenție de apă și creștere în greutate.

Alte reacții adverse posibile la Ibuvalen 400 mg sunt:

Foarte frecvente:

- tulburări la nivelul tractului digestiv, cum sunt diaree, greață, vărsături, flatulență, constipație.

Frecvente:

- Ulcer la nivelul tractului digestiv cu sau fără perforație;
- Inflamație a intestinului și agravare a inflamației colonului (colită) și a intestinului (boală Crohn) și complicații ale diverticulitei de la nivelul intestinului gros (perforație sau fistulă);
- Sângerare microscopică intestinală care poate conduce la anemie;
- Ulcere la nivelul gurii și inflamație;
- Durere de cap, somnolență, senzație de învârtire, amețeli, oboseală, agitație, insomnie și iritabilitate.

Mai puțin frecvente:

- Inflamație a mucoasei stomacului;
- Probleme renale, incluzând formare de edem, inflamație a rinichilor și insuficiență renală;
- Secreții nazale;
- Dificultăți în respirație (bronhospasm).

Rare:

- Depresie, confuzie, halucinații;
- Sindrom de lupus eritematos;
- Creștere a azotului ureic din sânge și a altor valori serice ale enzimelor ficatului, scădere a valorilor hemoglobinei și ale hematocritului, inhibare a agregării plachetelor și timp de sângerare prelungit, scădere a calciului din sânge și creștere a valorilor acidului uric din sânge.

Foarte rare:

- Percepere neplăcută a bătăilor inimii, insuficiență cardiacă, infarct miocardic sau tensiune arterială mare;
- Tulburări de formare a celulelor sanguine (cu simptome precum: febră, durere în gât, ulcere la nivelul suprafeței gurii, simptome de gripă, oboseală severă, sângerare la nivelul pielii și nasului);
- Țiuțuri și vâjâituri în urechi;
- Inflamație a esofagului sau a pancreasului;
- Îngustare a lumenului intestinal;
- Inflamație acută a ficatului, colorare în galben a pielii sau a albului ochilor, disfuncție, leziune sau insuficiență hepatică;
- Inflamație a membranei creierului (fără infecție bacteriană);
- Lezare a țesutului rinichilor;
- Cădere a părului.

Cu frecvență necunoscută:

- Senzație de furnicăături la nivelul mâinilor și picioarelor
- Anxietate
- Afectarea auzului
- Senzație sau stare generală de rău
- Inflamația nervului optic, care poate duce la probleme de vedere

Ibuvalen 400 mg poate determina scăderea numărului de globule albe și a rezistenței dumneavoastră la infecții. Dacă prezentați o infecție cu simptome, cum sunt febră și deteriorare gravă a stării generale sau febră cu simptome de infecție locală, cum sunt durere în gât/faringe/gură sau probleme urinare, trebuie să vă prezentați imediat la medicul dumneavoastră.

Vi se va face un test sanguin pentru a investiga o posibilă scădere a numărului de globule albe (agranulocitoză). Este important să vă adresați medicului dumneavoastră cu privire la medicamentul dumneavoastră.

În timpul tratamentului cu ibuprofen, cazuri rare de meningită (manifestate prin rigiditate a gâtului, durere de cap, greață, vărsături, febră sau dezorientare) au fost observate la pacienții cu tulburări autoimune existente, cum este lupusul eritematos sistemic sau boala mixtă a țesutului conjunctiv.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro>.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Ibuvalen 400 mg

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

A se păstra în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Ibuvalen 400 mg

- Substanța activă este ibuprofen. Fiecare capsulă conține ibuprofen 400 mg.
- Celelalte componente sunt: dioxid de siliciu coloidal anhidru, gelatină, dioxid de titan (E171), Ponceau 4R (E 124), Albastru patent V (E 131).

Cum arată Ibuvalen 400 mg și conținutul ambalajului

Capsule gelatinoase tari, de culoare albastră, opacă, mărimea 0, care conțin o pulbere de culoare albă până la aproape albă.

Cutie cu un blister din PVC-PVdC/Al a 10 capsule.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

POLISANO PHARMACEUTICALS S.A.

Șos. Alba Iulia nr. 156, cod 550052, Sibiu, jud. Sibiu, România

Fabricant

POLISANO PHARMACEUTICALS S.A.

Șos. Alba Iulia nr. 156, cod 550052, Sibiu, jud. Sibiu, România

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2022.